

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ СОРТООЦЕНКА ПИОНОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН БЕЛАРУСИ

В.В. Гайшун

Центральный ботанический сад АН Беларуси, г. Минск

*Анализ и прогнозирование результатов интродукции  
декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады /  
Материалы 2-й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. –  
Минск: Тэхналогія, 1996. - 126с.*

*[Paeoniaceae Paeonia x hybrida]*

*[Paeoniaceae Paeonia hybrida]*

Сортоизучение пионов в Центральном ботаническом саду АНБ проводится по методике В. Н. Былова (1971). За период 1992-1994 гг. сортооценку прошли 57 сортов пионов. Каждый сорт оценивали по 10 признакам (декоративные качества цветка, оригинальность сорта, архитектура куста и др.) с учетом коэффициента значимости по 100-балльной шкале.

Выделено 37 сортов, получивших при оценке декоративных качеств 98-100 баллов. По срокам цветения сорта разделены на ранние (начало цветения 4.06- 10.06) и среднецветущие (11.06-17.06). Два сорта (Ревард и Брайд) оказались в условиях ЦБС АНБ суперранними (23.05 и 31.05 соответственно). В 1994 г. цветение у всех сортов наблюдали на две недели позже обычного в связи с холодной, затяжной весной. Продолжительность цветения пионов в среднем составляет 10-12 дней в жаркую сухую погоду и 12-18 дней - в прохладную.

Для срезочных сортов важное значение имеет такой признак, как размер цветка. Выделены сорта с крупными (16-18 см в диаметре), средними (15-18 см) и мелкими (10-12 см) цветками. По результатам сравнительной оценки декоративных качеств к категории лучших отнесены 14 сортов, в том числе махровые (Канзас, Ник Шейлор, Эдвин Ц. Биллз, Принцесса Маргарет, Блэш Квин, Корнелия Шейлор, Александр Флеминг, Мадам Клауд Тен) и 5 немахровых и японских (Вестернер, Вайкики, Ларго, Суругу, Брайд).